

## ERRATA – Katalog přípravků na ochranu rostlin 2022

V tomto dokumentu naleznete opravu chyb uvedených v katalogu, tak aby byly v souladu s platným rozhodnutím o povolení. Děkujeme za pochopení.

### HERBICIDY

#### **Rim 25 WG (5300-0)**

V indikační tabulce na str. 52 u indikace kukuřice není uvedeno omezení „mimo kukuřice cukrová“.

Správné znění tabulky zní:

Plodina	Škodlivý organismus	Aplikační dávka		OL	Poznámka
		přípravek	voda		
Kukuřice mimo kukuřice cukrová	plevele 1- a 2-děložné jednoleté a vytrvalé	60 g + 0,1 % Glyfin	200-300 l/ha	AT	BBCH 11-17
brambory	plevele 1- a 2-děložné jednoleté a vytrvalé	60 g + 0,1 % Glyfin	200-300 l/ha	AT	BBCH 11-17

#### **RiNiDi WG (5723-0)**

Na str. 55 je v odstavci „RiNiDi WG spektrum účinnosti“ uveden seznam plevelů, kterých citlivost nebyla vyhodnocena UKZUZ z hlediska účinnosti. Tento seznam vyplývá ze zkušenosti v dosavadní agronomické praxi. Seznam plevelů, kterých citlivost byla vyhodnocena UKZUZ z hlediska účinnosti je uveden v platné etiketě přípravku.

### FUNGICIDY

#### **Azyl (5398-4)**

Na str. 5 je v odstavci „Azyl – návod k použití“ uvedeno:

„Účinná látka azoxystrobin spolehlivě kontroluje široké spektrum chorob (braničnatka plevová a pšeničná, rez pšeničná, **plevová** a ječná, **padlí travní, rynchosporiová** a hnědá skvrnitost ječmene a další).

Správné znění odstavce je:

„Účinná látka azoxystrobin spolehlivě kontroluje široké spektrum chorob (braničnatka plevová a pšeničná, rez pšeničná a ječná, hnědá skvrnitost ječmene a další).

#### **Metso (5923-0)**

V katalogu na str. 15 je pod indikační tabulkou uvedeno:

„Maximální počet aplikací v plodině 2x“

Správné znění je:

„Maximální počet aplikací v plodině 1x“

#### **Tebusha 25% EW (4811-0)**

Na str. 26 je uvedeno:

„Účinná látka tebuconazole má účinnost i na další choroby: braničnatky, rzi, hnědou a rynchosporiovou skvrnitost ječmene, plíseň šedou, černě.“

Tyto indikace nejsou uvedeny v platném rozhodnutí o povolení.